LIFTER™

Pionizator statyczny
Kody NFZ: **S.10.01**

Pionizator statyczny LIFTER™ jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym. Pozwala użytkownikowi na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu. Możliwe jest to dzięki bardzo mocnemu siłownikowi elektrycznemu zintegrowanemu z siedziskiem, który może podnieść osoby o wadze do 120 kg. Dla użytkowników z niedowładem kończyn górnych istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia pionizatora LIFTER™ w stabilizator górnej części tułowia, który doskonale unieruchamia klatkę piersiową. Siedzisko LIFTERa™ dodatkowo spełnia funkcję peloty biodrowej, która utrzymuje użytkownika we właściwej pozycji i daje mu duże poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji.

Łatwa obsługa

24 miesiące gwarancji

Stabilna konstrukcja



Ergonomicznie wyprofilowane i regulowane peloty kolanowe doskonale stabilizują kończyny dolne.



Nowoczesny system wspomagania pionizacji za pomocą ruchomego ramienia, siłownika i pilota pomaga przyjąć pozycję pionową.





120 - 200 cm
Orientacyjny wzrost użytkownika

120 kg
Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika

Więcej szczegółów na temat produktu znajdziesz na naszej stronie internetowej.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie | Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów | Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne) | Przepuklinę oponowo-rdzeniową | Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe) | Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn | Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego | Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów | Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu | Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA
Obserwacja: Monitorować użytkownika podczas pionizacji. Przerwać terapię w przypadku zblednięcia, pocenia się, zasłabnięcia, przeciążenia stawów, deformacji ciała; skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą | **Przeciwwskazanie bezwzględne:** Krytyczny stan użytkownika | **Przeciwwskazania względne:** Nadciśnienie > 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, zaburzenia metaboliczne, umiarkowane choroby zastawek serca | Gojące się złamania lub osteoporoza uniemożliwiająca obciążenie ciałem | Złamania z niepełnym zrostem (po konsultacji z lekarzem) | Pooperacyjne ograniczenia obciążania stawów | Ból związany ze zwichnięciem, rozciąganiem tkanek lub nadmiernym uciskiem; podwichnięcie bez bólu nie jest przeciwwskazaniem | Znaczne zgięcie w stawach biodrowych/kolanowych lub przykurcze stawu skokowego; należy unikać nadmiernego ucisku lub rozciągania.